

MultiFol KOMPLET

TASAKAALUSTATUD LEHEVÄETIS



TERAVILI



MAIS



KARTUL

MultiFol KOMPLET on lehekaudseks väetamiseks mõeldud vedel väetis, mis toetab taime olulistes kasvufaasides põhitoidainete, teiseste toiteelementide ja mikroelementide seguga. Toode sobib kasutamiseks teraviljal, maisil ja kartulil ning aitab tagada tasakaalustatud toitumise kogu kasvuperioodi jooksul.

EELISED



kiire lehekaudne tugi



tasakaalustatud koostis



toetab taime olulistes kasvufaasides



sobib teraviljale, maisile ja kartulile



aitab hoida taimede head üldist seisundit



KULUNORM

Taliteraviljad:

1,5–2,0 l/ha



SOOVITUSLIK KASUTUSAEG



pritsimine:

kevadise vegetatsiooni algusest kuni võrsumise lõpuni



pritsimine:

lipulehe faasis



pritsimine:

õitsemise lõpust kuni piimküpsuse faasini



PAKENDID

5 L 20 L

Lehetoitmine,
kui taime vajab mitmekülgset tuge.

MultiFol KOMPLET



Koostis ja kasutussoovitused

Tasakaalustatud lehevätis põhi- ja mikroelementidega oluliste kasvufaaside toetamiseks.



1. KOOSTIS

Üldlämmastik (N)

% m/m

16,0

Amiidlämmastik (N)

16,0

Magneesiumoksiid (MgO)

2,6

(Mg – 1,5)

Vääveltrioksiid (SO₂)

9,8

(S – 3,9)

Vask (Cu), sulfaatvormis

1,1

Raud (Fe), sulfaatvormis

0,8

Mangaan (Mn), sulfaatvormis

2,1

Moliibdeen (Mo), ammooniumsoola vormis

0,005

Tsink (Zn), sulfaatvormis

1,2



2. ORIENTEERUVAD KULUNORMID JA KASUTUSAJAD

| Kultuur | Kulunorm (l/ha) | Kasutusaeg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Taliteraviljad | 1,5–2,0 | I pritsimine: kevadise kasvu algusest kuni võrsumise lõpuni. II pritsimine: lipulehe faasis. III pritsimine: õitsemise lõpust kuni terade piimküpsuseni. |
|  Raps | 1,5–2,0 | Sügisel 4–6 pärislehe faasis. Kevadel kasvu algusest kuni õiepunga avanemise eelse faasini. |
|  Mais | 1,5–2,0 | Kasutada 4–6 pärislehe faasis. Teha 2–3 pritsimist. |
|  Suhkrupeet | 1,0–2,0 | Kasutada 6 pärislehe faasist kuni reavahede sulgumiseni. Soovitav pritsimiste vahe 10–14 päeva. |
|  Viljapuud | 2,0–3,0 | Kevadel vegetatsioonil algusest. Kasutada intensiivse vegetatiivse kasvu perioodil pärast õitsemist kuni viljad on saavutanud umbes 50% suuruselt. |
|  Roosid ja põõsad | 1,0–2,0 | Kasutada intensiivse vegetatiivse kasvu perioodil. |
|  Tomat | 1,5–2,0 | Kevadel 14 päeva pärast istutamist. Kasutada intensiivse vegetatiivse kasvu perioodil pärast õitsemist kuni viljad on saavutanud umbes 50% suuruselt. |
|  Kurk | 1,5–2,0 | Kasutada intensiivse vegetatiivse kasvu perioodil. Teha 2–5 pritsimist. |
|  Kõik köögiviljad | 2,0–3,0 | Kasutada intensiivse vegetatiivse kasvu perioodil. Teha 2–5 pritsimist. |



TASAKAALUSTATUD TOITUMINE
Tervislikud taimed, saagikus ja kvaliteet.

